



# DICOHERB® SUPER 750 SL



## END AJAS TÕESTANUD LAHENDUS UMBROHTUDE VASTU!

- Lai tõrjespekter laialehelistele umbrohtudele
- Tõhusate toimeainete kombinatsioon
- Unikaalne toimeviis
- Kiire imendumine (4-6 tundi)
- Ohutu kultuurile

<b>Kultuurid</b>	Teraviljad (talinisu, rukis, talitritikale, suvioder, suvinisu, suvitritikale)
<b>Toimeained</b>	MCPA (DMA sool) 660g/l + Dikamba (DMA sool) 90 g/l
<b>Formulatsioon</b>	SL – lahustuv vedelik
<b>HRAC kood</b>	MCPA + Dikamba
<b>Toimevis</b>	MCPA ja dikamba toime nagu IAA (sünteetilised auksiinid)
<b>Tõrjespekter</b>	Ühe- ja mitmeaastased laialehelised umbrohud nagu põldsinep, malts, harilik hiirekõrv, põldohakas, magun, punand
<b>Kulunorm</b>	1,0 - 1,25 l/ha
<b>Pakend</b>	10L



### Lai tõrjespekter laialehelistele umbrohtudele

Kuluefektiivne lahendus ühe- ja mitmeaastastele umbrohtudele nagu põldsinep, valge hanemalts, harilik hiirekõrv, põldohakas, kukemagun ja punand.



### Tõhusate toimeainete kombinatsioon

Usaldusväärne ja stabiilne toime põhiliste umbrohtude tõrjeks teraviljades.



### Toimeviis

Dicoherb Super on tõhus vahend resistentsusstrateegias selliste umbrohtude tõrjeks nagu kukemagun, vesihein ja rukkilill.



### Lehte imendumine 4-6 tundi

### Ohutus


Dicoherb Super'i formulatsioon on ohutu teraviljadele ja järelkultuuridele.

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow


## Dicoherb Super efektiivsus taliteraviljades kasvufaasis BBCH 30-31, T +13,4°C, hindamine 44 päeva peale pritsimist

Umbrohi
Centaurea cyanus (Rukkilill)
Matricaria inodora (Harilik kesalill)
Stellaria media (Vesihein)
Lamium purpureum (Verev iminõges)
Gallium aparine (Roomav madar)
Brassica napus (Raps)
Veronica persica (Pärsia mailane)
Senecio vulgaris (Harilik ristirohi)
Viola arvensis (Pöidkannike)



## Dicoherb Super efektiivsus suviteraviljades kasvufaasis BBCH 29-30, T +21,2°C, hindamine 44 päeva peale pritsimist


Umbrohi
Persicaria maculosa (Harilik kirbutatar)
Chenopodium album (Valge hanemalts)
Viola arvensis (Pöidkannike)
Polygonum aviculare (Harilik linnurohi)
Tripleurospermum inodorum (Harilik kesalill)
Capsella bursa pastoris (Harilik hiirekõrv)
Sinapis arvensis (Pöidsinep)
Polygonum convolvulus (Eritehine linnurohi)
Geranium pratense (Aas-kureheha)



## Kasutussoovitused

### DICOHERB® SUPER 750 SL

1,0 – 1,25 l/ha



- kevadine kasutamine
- kasutamine taliteraviljades kasvufaasis BBCH 20-30
- kasutamine suviteraviljades kasvufaasis BBCH 13-30
- temperatuuridel alates 10 °C kuni 25 °C
- veekulu: 200-300 l