

Folur S  
Lämmastiku väetislahus, mis on rikastatud väävliga

Väetise koostis	Mahu %	Massi %
Üldlämmastik (N)	26,0	20,0
Karbamiidlämmastik	19,1	14,7
Ammooniumlämmastik	6,8	5,3
Väävel (SO <sub>3</sub> )	19,5	15,0
Biureet	<0,23	0,18

Väetise netomass 20 L (26 kg); 1000 L (1300 kg)

### Kasutamine

Lehtede kaudu pritsimiseks:

Teraviljad: 5-10 l/ha võrsumise lõppfaasist kuni pea 1 cm  
5-10 l/ha kui lipuleht on lahti rullunud  
10-20 l/ha kui pea loomine on lõppenud (tolmukad langevad)  
Reguleeri kasutusnormi vastavalt kultuuri saagipotentsiaalile ja proteiinisisalduse vähenemise riskile.

Raps: 5-10 l/ha rosetifaasist kõtrade moodustumise alguseni  
Porrulauk: 5 l/ha niipea, kui on piisavalt lehestikku  
Ristõielised köögiviljad: 5 l/ha niipea, kui on piisavalt lehestikku  
Muud köögiviljad: 5 l/ha niipea, kui on piisavalt lehestikku

Mitte pritsida taimi tugeva päikesepaistega, kuuma ( $t^{\circ} > 27^{\circ} \text{C}$ ) ja kuiva ilma korral. Vältida pritsima minekut, kui taimed on kastemärjad või kui on tugev tuul.

Väikseim lubatud veekogus 100-150 l/ha.

### Kasutamine paagisegudes

Sobib paagisegudes koos kasutamiseks enamiku väetiste ja taimekaitsevahenditega. Mitte kasutada koos vasepreparaatidega. Vähihimagi kahtluse korral kontrollida toodete kokkusobivust väikeste aine kogustega. Mitte kasutada paagisegus rohkem kui kahte toodet korraga. Parima tulemuse saamiseks pritsida taimi, kui lehed on kuivad. Et ained imenduksid maksimaalselt läbi lehepinna on vajalik, et 3-4 h pärast töötlust püsiks sademeteta kuiv ilm.

### Hoiatused, käitlemine ja hoiustamine

Enne kasutamist korralikult loksutada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte süüa, juua ega suitsetada toote käitlemise, kasutamise ajal. Hoiustada originaalpakendis kuivas kohas kaitstult ekstreemsete temperatuuride eest. Järgida etiketil olevaid kasutusjuhiseid. Vähihimagi kahtluse korral pöörduda asjatundjate poole.

Tootmise kuupäev:

Partii nr:

Aegumine: 2 aasta möödudes tootmise kuupäevast